미숙아의 안축장에 영향을 미치는 요인에 대한 분석

박대일 · 하성우 · 박성배 · 윤영수

차 의과학대학교 분당차병원 안과학교실

목적: 미숙아의 안축장 길이를 측정하여 미숙아망막증 유무 및 stage, 성별, 출생 주수, 출생 체중 및 동반 질환과의 관계에 대해 알아 보았다.

대상과 방법: 임신 주수 36주 미만의 미숙아 51명, 102안에 대해 안저 검사 후, 임신 주수 40주, 52주, 64주경에 안축장을 측정하였고, 후향적 의무기록 분석을 시행하여, 미숙아망막증 유무, stage, 출생 주수, 출생 체중 및 동반질환에 대한 상관관계를 회귀 분석과 독립 T-검정, 일원배치 분산분석을 시행하였다.

결과: 미숙아망막증과 안축장은 임신 40주에 측정된 값이 미숙아망막증이 있는 군에서 더 작았고, stage가 증가할수록 더 작았다 ($p<0.05$). 출생 체중과 안축장과의 관계는 40주에 측정된 값과 유의한 양의 상관관계가 있었으며($p=0.002$), 출생 주수가 길수록 임신 주수 40주의 안축장이 증가하는 결과를 보였다($p=0.000$). 하지만 성별, 동반 질환등과는 유의한 상관관계가 나타나지 않았다.

결론: 미숙아 안의 안축장에 영향을 끼치는 인자로는 40주 때, 출생 체중과 출생 주수, 미숙아망막증 유무 및 stage가 있고, 성별, 동반 질환 등은 관련 없었다.

〈대한안과학회지 2010;51(1):81-87〉

안구의 길이는 각막의 굴절력과 함께 개인의 굴절상태를 결정하는 가장 중요한 요소 중의 하나로, 각막의 중량을 전극, 공막 후면의 중량을 후극이라하여 이 두 개의 양극을 잇는 가상의 선을 지칭하며, Yamamoto¹가 1960년 초음파를 이용하여 처음 측정한 이래 Sorsby,² Larsen,^{3,4} Coleman and Carlin⁵ 등 여러 학자들이 초음파 생체계측에 의한 안축장에 관해서 보고한 바 있다.⁶

이렇게 측정된 안축장은 백내장에서 인공수정체 도수 계산 공식에 있어 중요한 요소일 뿐 아니라 선천성 녹내장의 진단 및 예후에도 이용되며, 내사시 수술 시 수술 교정량을 결정하는데도 고려해야 할 요소이다.⁷⁻¹¹

미숙아에서는 근시 및 고도근시, 난시, 부등시등의 굴절 이상의 발생률이 만삭아에 비해 높은 것으로 보고되며, 출생 체중의 감소와 미숙아망막병증의 stage가 증가함에 2세까지의 근시 진행에 영향을 끼친다.¹² 미숙아에서의 근시에 대한 기전은 정확히 밝혀지진 않았으나, 이에겐 얇은 전방 깊이, 높은 수정체의 굴절력, 각막곡률값의 증가가 관련이

있는 것으로 알려져 있으며 안축장 또한 근시 발생에 큰 영향을 끼치는 요소이다.¹³

따라서 미숙아 안축장의 길이는 향후 근시 등의 굴절 이상 발생을 예측하는데 의미가 있다. 기존에 이미 미숙아의 안축장 변화에 대한 보고가 있었으나 이는 대부분 출생 후 3개월 이내의 변화였으며 안축장에 직접적인 영향을 끼치는 요인들에 대한 분석은 이루어지지 않았다. 이에 본 연구는 미숙아 안의 안축장에 영향을 끼치는 요인을 알아보기 위해 미숙아망막증 유무 및 stage, 출생 체중, 출생 주수, 성별, 동반질환과의 관계에 대해 분석하였다.

대상과 방법

2007년 7월부터 2008년 11월까지 본원에서 태어난 임신 주수 36주 미만의 미숙아 51명 102안에 대해 안저 검사를 시행하였고, 임신 주수 40주, 52주, 64주경에 초음파 생체 계측기(A/B scan system Humphrey®, Inc, USA)를 이용하여 전방 깊이를 포함한 안축장을 측정하였다. 안축장의 측정은 Ultrasonography (A-scan. Transducer frequency of 10 MHz, Cilco)를 이용하여 안구내 각 부위의 음영이 최대파장을 보이면서 수직파가 나타날 때의 값을 취하였고, 0.5% proparacaine (Alcaine®, Alcon®, Belgium) 점안 마취 후 누운 자세에서 동일 검사자에 의해 편차가 0.1 mm 이상인 값은 제외한 총 5회의 값의 평균을 안축장의 길이로

■ 접수 일: 2009년 5월 25일 ■ 심사통과일: 2009년 10월 13일

■ 책임저자: 하 성 우

경기도 성남시 분당구 야탑동 351
차 의과학대학교 분당차병원 안과
Tel: 031-780-5330, Fax: 031-780-5333
E-mail: swha@chamc.co.kr

* 본 논문의 요지는 2008년 대한안과학회 제100회 추계학술대회에서 포스터로 발표되었음.

Table 1. Patient data

	N*	Mean $\pm$ SD [†] (range)
Birth age (weeks)	102	30.59 $\pm$ 2.8 (24.71–35.86)
Birth weight (gram)	102	1495.45 $\pm$ 511.66 (680–3260)
Anterior chamber at 40week (mm)	102	2.23 $\pm$ 0.19 (2.02–2.77)
Male	44	43.14%
Female	58	56.86%
With ROP [‡]	54	52.94%
Without ROP	48	47.06%
Associated disease	31	61%
Respiratory distress syndrome	16	52%
Intraventricular hemorrhage	3	10%
Necrotizing enterocolitis	1	3%
Bronchopulmonary dysplasia	3	10%
More than 2 Diseases	8	26%

* N=number; [†] SD=standard deviation; [‡] ROP=retinopathy of prematurity.

Table 2. Factors affecting axial length of premature infant's eye

Factor		At 40 weeks		At 52 weeks		At 64 weeks	
		N	Axial length (mm)	N	Axial length (mm)	N	Axial length (mm)
Sex	Male	58	17.38	24	18.84	20	19.85
	Female	44	17.31	18	18.74	14	19.62
	<i>p</i> -value		0.564		0.626		0.649
ROP*	Absence	54	17.54	12	18.24	10	19.80
	Present	48	17.13	30	18.62	24	19.77
	<i>p</i> -value		0.000*		0.006*		0.913
Associated diseases	Absence	40	17.32	20	18.72	16	19.92
	Present	62	17.36	22	18.87	18	19.65
	<i>p</i> -value		0.725		0.496		0.220
Associated Diseases number	1 Disease	42	17.32	16	18.94	10	19.63
	More than 2 disease	22	17.37	8	18.56	8	19.68
	<i>p</i> -value		0.735		0.283		0.885
Respiratory disease	Absence	48	17.31	22	18.81	20	19.96
	Present	54	17.40	20	18.79	14	19.52
	<i>p</i> -value		0.455		0.937		0.243

Statistical significance was tested by independent-*t* test. *p*<0.05; * ROP=retinopathy of prematurity.

하였다. 대상자의 성별, 체중, 동반 질환 등은 후향적으로 의무기록을 통해 분석하였다. 각 요인과 안축장과의 연관성에 대한 통계적인 유의성은 SPSS® (Statistical software, ver.12.0; SPSS Inc., Chicago, IL) 통계 프로그램을 이용하여, 출생 체중과 출생 주수와 관계는 회귀 분석으로, 미숙아 망막증 유무, 성별 및 동반 질환과의 관계는 독립표본 *T*-검정, 그리고 각 stage와의 관계는 일원배치 분산분석을 시행하였다.

결 과

총 51명의 미숙아 중, 남녀 성비는 남자 22명, 여자 29명이었으며, 출생 주수는 평균 30.6주(24.71–35.86주)이었

고, 출생 체중은 평균 1495.5 g (680–3260 g)이었다. 미숙아 망막증이 있는 환아는 24명 48안이었고, 미숙아 망막증이 없는 환아는 27명 54안이었다. 미숙아 망막증이 있는 군에서는 stage 1이 34안, stage 2가 10안, stage 3가 4안이었다. 미숙아 망막증 환아는 모두 ETROP (The early treatment of retinopathy of prematurity trial) type 2 ROP로 레이저 치료가 필요치 않은 정도의 미숙아 망막증을 가진 환아들이었다. 31명의 미숙아에서 동반된 질환이 있었으며, 동반된 질환으로는 호흡 곤란 증후군 단독으로 있는 경우가 16명으로 가장 많았고, 그 외 기관지폐형성 이상, 뇌실내 출혈, 간질환, 괴사성 장염 등이었다(Table 1).

임신 주수 40주에 측정된 안축장의 평균 길이는 17.35 mm (16.12–18.97 mm)였으며, 52주, 18.80 mm (17.65–20.62

Figure 1. Changes in axial length for each stage of ROP with conceptual age.

Figure 2. Changes in anterior chamber depth for each stage of ROP with conceptual age

Figure 3. Relationship between birth weight and axial length. (AL: axial length)

Figure 4. Relationship between conceptual age and axial length. (AL: axial length)

mm), 64주 19.78 mm (18.78~21.18 mm)이었고, 임신 주수 40주의 전방의 깊이는 평균 2.23 mm (2.02~2.77 mm)이었다(Table 3).

미숙아망막증 유무에 따른 안축장의 길이는 임신 40주에 측정한 값이 미숙아망막증이 없는 군에서 평균 17.54 mm, 망막증이 있는 군에서는 평균 17.13 mm로 통계적으로 의미가 있었으나($p<0.05$) 64주에 측정한 결과에서는 차이가

없었다($p=0.913$). 각 stage별 안축장의 길이는 stage가 높아질수록 전방깊이와 안축장이 더 작은 경향을 나타냈으며 이는 40주에서 통계적으로 유의하였다($F=0.975$, $p<0.05$) (Table 4, Fig. 1, 2). 성별에 따른 안축장의 길이는 여자에서 평균 17.31 mm, 남자에서 평균 17.38 mm로 유의한 차이가 없었으며($p=0.564$), 이는 64주에 측정한 값에서도 각각 평균 19.62 mm, 19.85 mm로 유의한 차이를 나타내

Table 3. Mean anterior chamber depth and axial length

	N*	Mean	SD [†]	Min	Max
Anterior chamber at 40 weeks	102	2.23	±0.19	2.02	2.77
Anterior chamber at 52 weeks	42	2.58	±0.22	2.11	2.95
Anterior chamber at 64 weeks	34	2.81	±0.22	2.37	3.10
Axial length at 40 weeks	102	17.35	±0.61	16.12	18.97
Axial length at 52 weeks	42	18.80	±0.68	17.6	20.62
Axial length at 64 weeks	34	19.78	±0.63	18.78	21.18

* N=number; [†] SD=standard deviation.

Figure 5. Relationship between birth weight and axial length in ROP group. (AL: axial length)

Figure 6. Relationship between conceptual age and axial length in ROP group. (AL: axial length)

Figure 7. Relationship between birth weight and axial length in without ROP group. (AL: axial length)

Figure 8. Relationship between conceptual age and axial length in without ROP group. (AL: axial length)

지 않았다($p=0.649$). 또한 동반질환 유무에 따른 안축장의 차이는 통계학적으로 유의하지 않았다($p=0.725$)(Table 2).

미숙아에서 출생 체중과 안축장과의 관계는 40주에 측정 한 값에서 유의한 양의 상관관계가 있었으나($p=0.002$), 64주에 측정한 결과는 양의 상관관계가 있었으나 통계학적으로 유의하지 않았다($p=0.122$)(Fig. 3). 출생 주수와 안 축장과의 관계는 출생 주수가 길수록 임신 주수 40주에 측 정한 값이 길어지는 결과를 보였으나($p<0.05$), 64주에 측 정한 결과는 음의 상관관계를 나타내지만 통계학적으로 유 의하지는 않았다($p=0.305$)(Fig. 4).

추가적으로 미숙아망막증이 있는 24명의 48안에서 분석 한 출생 체중과 안축장, 출생 주수와 안축장과의 관계도 40 주에서는 유의한 상관관계를 나타냈으나, 64주에서는 상관

관계가 없었다(Fig. 5, 6).

미숙아망막증이 없는 27명의 54안에서도 미숙아망막증 이 있는 군과 비슷한 결과가 나타났으며 통계적으로 유의 하지는 않았으나, 예외적으로 52주에서 반비례 관계를 보 였다(Fig. 7, 8).

2001년 미국 소아과학회와 소아안과학회, 안과학회에서 공동으로 발표한 미숙아망막증 선별 검사의 원칙에 해당하 는 출생체중 1500g 미만이거나 임신 주수가 28주 미만인 군에서 안축장 변화는 전체 미숙아에서 선별 검사 대상군 의 안축장이 작았으며, 이는 통계적으로 유의하였다.¹⁴ 반면 에 미숙아망막증이 동반된 군에서는 선별 검사 대상군과 대 조군간의 유의한 차이가 나타나지는 않았다. 또한 미숙아망 막증이 없는 군에서는 출생 체중이 1500g 미만의 선별 검사

Table 4. Summary statistics, each time point, for stage of ROP

Parameter	Stage of Rop	n*	40 weeks		52 weeks		64 weeks	
			mean	SD [†]	mean	SD	mean	SD
ACD [‡] (mm)	0	54	2.23	±0.21	2.63	±0.22	2.79	±0.22
	1	34	2.26	±0.19	2.51	±0.23	2.72	±0.20
	2	10	2.17	±0.08	2.62	±0.16	2.85	±0.18
	3	4	2.11	±0.06	2.52	±0.05	2.69	±0.02
AL [§] (mm)	0	54	17.54	±0.61	18.94	±0.84	19.8	±0.57
	1	34	17.22	±0.47	18.66	±0.56	19.75	±0.65
	2	10	17.08	±0.64	18.76	±0.23	19.91	±0.75
	3	4	16.48	±0.02	18.52	±0.07	19.27	±0.14

* N=number; [†] SD=standard deviation; [‡] ACD=anterior chamber depth; [§] AL=axial length.

Table 5. Axial length in preterm infants who require ROP screening examination

			At 40 wks			At 52 wks			At 64 wks		
			N	Axial length (mm)	SD [†]	N	Axial length (mm)	SD	N	Axial length (mm)	SD
All	Birth weight (gram)	≥1500	48	17.63	±0.55	12	18.68	±0.49	10	20.13	±0.50
		<1500	54	17.09	±0.54	31	18.76	±0.62	26	19.60	±0.61
		(p-value)		0.000 [‡]			0.673			0.021 [‡]	
	Conceptual age(week)	≥28	82	17.44	±0.61	25	18.71	±0.72	20	19.68	±0.60
		<28	22	17.01	±0.48	18	18.77	±0.32	16	19.83	±0.66
		(p-value)		0.003 [‡]			0.736			0.465	
Without ROP	Birth weight (gram)	≥1500	36	17.63	±0.55	6	18.60	±0.10	6	20.15	±0.44
		<1500	18	17.09	±0.54	5	19.35	±1.18	4	19.26	±0.12
		(p-value)		0.002 [‡]			0.226			0.003 [‡]	
	Conceptual age (week)	≥28	52	17.56	±0.61	11	18.94	±0.84	10	19.80	±0.57
		<28	2	16.92	±0.00	0			0		
		(p-value)		0.143							
With ROP [§]	Birth weight (gram)	≥1500	12	17.32	±0.62	6	18.75	±0.71	4	20.09	±0.66
		<1500	36	17.06	±0.49	26	18.65	±0.40	22	19.66	±0.64
		(p-value)		0.143			0.625			0.236	
	Conceptual age (week)	≥28	28	17.21	±0.54	14	18.53	±0.58	10	19.56	±0.64
		<28	20	17.01	±0.50	18	18.77	±0.32	16	19.83	±0.66
		(p-value)		0.217			0.139			0.309	

* N=number; [†] SD=standard deviation; [‡] Statistical significance was tested by independent-t test. $p<0.05$; [§] ROP=retinopathy of prematurity.

대상군에서 안축장이 유의하게 작았다(Table 5).

고 찰

신생아의 안축장에 대해서 Sorsby²는 17.9 mm, Blomdahl¹⁵은 16.6 mm, Gordon and Donzis¹⁶는 16.8 mm 라고 보고 하였다. Larsen⁴은 평균 안축장이 16.5 mm이고, 출생시에 남녀 성별 차이가 있다고 보고 하였으나 Cho et al¹⁷이 보고 한 결과에서는 성별간의 유의한 차이는 없었고, 이는 본 연구에서도 유의하지 않았다.

정상 소아의 안축장은 출생 시 성인의 크기에 비교적 근접해 있으며, 성장은 출생 후 첫 해에 성장 속도가 가장 빠르며, 사춘기 이전에 성장이 완료되어 성인의 크기에 도달한다.⁴

미숙아의 안축장 길이에 대해 Harayama et al¹⁸은 임신 상의 연령 증가에 따라 안축장이 증가한다고 하였는데 34주에

는 15.1 mm, 36주에는 16.1 mm, 40주에는 17.3 mm에 이른다고 하였고, Kim et al¹⁹은 정상 신생아의 출생 시기에 해당하는 40주에 17.48 mm로 정상 신생아와의 유의한 차이는 없다고 하였다. 본 연구에서도 40주에 평균 17.35 mm (16.12~18.97 mm)였으며 이는 기존의 연구와 큰 차이가 없었으며, 본 연구에서만 52주, 18.76 mm(17.65~ 20.62 mm), 64주 19.78 mm (18.78~21.18 mm)로 미숙아 안의 안축장에 대한 임신 주수에 따른 좀 더 긴 경과관찰이 이루어졌으며, 64주 동안 평균 2.43 mm의 안축장 증가를 보였다.

또한 Cho et al¹⁷은 신생아의 평균 전방 깊이를 2.62 mm로 보고하였으나 본 연구에서는 정상 신생아 출생 주수에 해당하는 40주에 평균 2.23 mm로 미숙아에서 좀더 얇은 경향을 보였다. 이는 Cook et al²⁰이 보고한 안축장이 미숙아에서 좀더 짧고, 얇은 전방 깊이를 나타내는 것과 연관 있는 결과이다.

본 연구에서 미숙아망막증 유무에 따른 안축장의 길이는 임신 40주에 측정된 값이 미숙아망막증이 없는 군에서 17.54 mm, 망막증이 있는 군에서는 17.13 mm로 통계적으로 의미가 있었으며($p=0.000$), 이는 Cook et al²⁰이 보고한 미숙아망막증의 심한 정도와 안축장이 관련이 있다는 결과와 비슷한 결과를 나타내었다. 미숙아망막증 stage에 따른 전방 깊이와 안축장의 관계는 40주에서는 stage가 증가할수록 유의하게 그 값이 낮아지는 경향성을 나타냈으나 52주와 64주에서는 이러한 경향성이 뚜렷하게 나타나지는 않았다. 이는 52주, 64주에 측정된 값의 표준수의 부족으로 인해 통계학적 유의하지 않은 것으로 사료된다.

미숙아망막증 유무에 따른 안축장 길이가 64주에 통계적 유의성이 없었음은 본 연구에서 미숙아망막병증이 있던 환자 24명이 모두 자연 퇴행되었고, 출생 후 관리에 의해 미숙한 정도가 교정됨에 따라 정상 신생아와 차이가 없어진 것과 관련이 있다.

미숙아망막증은 출생 체중 1500g 미만이거나 출생 주수 28주 미만에서 그 위험도가 증가하는 경향이 있어 2001년 미국 소아과학회와 소아안과학회, 안과학회에서 공동으로 미숙아망막증 선별 검사 대상 군으로 제시하였다.¹⁴ 본 연구에서 전체 선별 검사 대상군의 안축장 길이는 좀 더 작은 경향성을 나타냈으나 미숙아망막증이 있는 군에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이는 미숙아망막증 자체가 안축장에 영향을 주는 요인으로 작용했기 때문이라 사료된다.

반면에 미숙아망막증이 없는 군에서는 출생 체중에 따라 1500g 미만인 군에서 유의하게 안축장이 작게 나타나 출생 체중이 안축장에 영향을 미치는 요소임을 다시 확인할 수 있었다. 하지만 출생 주수 28미만 군에 대한 분석은 그 표준수의 부족으로 인해 통계적인 의미를 부여 할 수 없었다.

Blomdahl¹⁵은 신생아에 있어 체중과 안축장 사이에 체중이 클수록 안축장이 길어지는 양상을 보이고, Cho et al¹⁷도 유의한 상관관계가 있다고 보고하였다. 미숙아 안의 경우에서도 Kim et al¹⁸이 유의한 상관 관계를 보임을 보고하였으며, 이는 본 연구에서도 유의한 상관관계를 나타내었다.

하지만 임신 40주에 측정된 안축장과 유의한 상관관계를 나타내었지만 이는 64주에 측정된 결과에는 유의하지 않았다. 이는 출생시 미숙아의 미숙한 상태가 후천적으로 교정되어 눈의 발달에 있어 차이가 없게 된 것으로 생각 된다.

동반 질환과의 관계에 있어서는 유의한 상관관계가 나타나지 않았다. 동반 질환 유무와 동반 질환의 개수 그리고 미숙아망막증의 위험인자인 산소치료가 필요한 호흡기 질환이 있는 경우를 분석하였으나 뚜렷한 상관 관계는 없었으며, 통계학적으로 유의하지 않았다. 기존의 연구에서는 산소 치료를 하는 경우에도 뚜렷한 안축장의 길이 변화는 없었다.²¹ 따

라서 산소 치료가 필요한 호흡기 질환 여부가 미숙아안축장에 직접적인 영향을 주는 지는 본 연구에서는 알 수 없었다.

본 연구는 미숙아에서 안축장의 길이에 대한 연구를 Kim et al¹⁹이 각 미숙아의 출생 40주까지의 결과를 좀더 연장하여 64주까지 측정하여 안축장 길이의 평균을 제시하였고, 안축장의 영향을 미치는 요인들에 대한 각각의 분석을 통해 출생 체중과 출생 주수와의 연관성을 밝혔음에 의의가 있다. 하지만 다른 연구들에서 시행한 굴절 검사가 이루어지지 않은 점과, 40주에 51명의 환아를 검사하였지만 64주까지 17명만이 추적검사가 이루어져 52주와 64주 결과가 통계적 신뢰성이 떨어지는 제한점이 있다. 또한 치료가 필요한 망막병증에 대한 예가 없어 심한 미숙아망막병증이 있을 때의 안축장 변화에는 의미를 부여할 수 없는 한계가 있다. 아울러 미숙아 출생 후 초기에 안축장에 미칠 수 있는 다른 환경적인 요인들에 의한 분석 또한 필요하다.

결론적으로 본 연구에서 임신 주수 40주까지는 미숙아망막증이 있는 군에서 없는 군에 비해 안축장이 더 작고, stage가 높을수록 더 작지만, 64 주에는 차이가 없어 미숙아망막증 자체가 장기적으로 안축장의 변화에 큰 영향을 끼치지 않는다는 것을 알 수 있었다. 또한 임신 주수 및 출생 체중 또한 같은 경향을 보여 초기에 미숙의 정도가 교정된다면 안축장의 변화는 심하지 않으리라 생각되어진다.

참고문헌

- 1) Yamamoto Y. A new study on the measurement of ocular axial length by ultrasound echography. *Acta Soc Ophthalmol Jpn* 1960;64:1333-41.
- 2) Sorsby A, Leary GA, Richards MJ, Chaston J. A Ultrasonographic measurement of the components of ocular refraction in life. *Vision Res* 1963;3:499-506.
- 3) Larsen JS. The sagittal growth of the eye. I. Ultrasonic measurement of the depth of the anterior chamber from birth to puberty. *Acta Ophthalmol* 1971;49:239-62.
- 4) Larsen JS. The sagittal growth of the eye. IV. Ultrasonic measurement of axial length of the eye from birth to puberty. *Acta Ophthalmol* 1971;49:873-86.
- 5) Coleman DJ, Carlin B. A new system for visual axis measurements in the human eye using ultrasound. *Arch Ophthalmol* 1967;77:124-7.
- 6) Duke-Elder S. System of Ophthalmology. Vol. 2. The Anatomy of visual System. St. Louis: CV Mosby, 1961;80-1.
- 7) Villada JR, Raj PS, Akingbehin T. Calculation of the power of anterior chamber implants. *Br J Ophthalmol* 1992;76:303-306.
- 8) Youn DH, Yu YS, Park IW. Intraocular pressure and axial length in children, *J Korean Ophthalmol Soc* 1990;31:397-401.
- 9) Woo JM, Kim SJ, Jeong SK, Park YG. The influence of axial length on the response to strabismus surgery. *J Korean Ophthalmol Soc* 1997;38:680-6.
- 10) Park HY, Park SW, Park YG. The study of axial length and func-

- tional equator in strabismus surgery. J Korean Ophthalmol Soc 2005;46:827-36.
- 11) Tarkkanen A, Uusitalo T, Mianowicz J. Ultrasonographic biometry in congenital glaucoma. Acta Ophthalmol 1983;61:618-23.
 - 12) Page J, Schneeweiss M, Whyte H, Harvey P. Ocular sequelae in premature infants. Pediatrics 1993;92:787-90.
 - 13) Choi MY, Park IK, Yu YS. Long term refractive outcome in eyes of preterm infants with and without retinopathy of prematurity: comparison of keratometric value, axial length, anterior chamber depth, and lens thickness. Br J Ophthalmol 2000;84:138-43.
 - 14) American Academy of Pediatrics. Section on Ophthalmology. Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics 2001;108:809-811.
 - 15) Blomdahl S. Ultrasonic measurement of eye in the newborn infant. Acta Ophthalmol 1979;57:1048-56.
 - 16) Gordon RA, Donzis PB. Refractive development of the human eye. Arch Ophthalmol 1985;103:785-91.
 - 17) Cho KS, Shim YB, Kim BC. Interrelationship between axial length and refractive states, and anterior chamber depth in the newborn. J Korean Ophthalmol Soc 1990;31:215-9.
 - 18) Harayama K, Amemiya T, Nishimura H. Development of the eyeball during fetal life, J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1981; 18:37-40.
 - 19) Kim WJ, Park SH, Shin Hh. The change of axial length according to age in the eyeball of premature infants by ultrasonic biometry. J Korean Ophthalmol Soc 1993;34:667-671.
 - 20) Cook A, White S, Batterbury M, Clark D. Ocular growth and refractive error development in premature infants with or without retinopathy of prematurity. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49: 5199-207.
 - 21) Fledelius HC, Jamsen EC, Thorn J. Refractive change during hyperbaric oxygen therapy. A clinical trial including ultrasound oculometry, Acta Ophthalmol Scand 2002;80:188-90.

=ABSTRACT=

Analysis of Factors Affecting the Change in Axial Length of Premature Infant's Eye

Dae Il Park, MD, Sung Woo Ha, MD, Seong Bae Park, MD, Young Soo Yun, MD

Department of Ophthalmology, CHA University, CHA Bundang Medical Center, Seongnam, Korea

Purpose: To analyze the effect of presence with or absent of retinopathy of prematurity (ROP) and its stage, birth weight, conceptual age and associated diseases on the axial length of premature infants' eye.

Methods: A total of 102 eyes of 51 premature infants less than 36 weeks of conceptual age were evaluated in this study. Fundus examination for ROP and axial length measurement were conducted at 40, 52 and 64 weeks of postconceptual age. The medical records were reviewed retrospectively. Independent t-test analysis, simple regression analysis, and one-way ANOVA were performed to assess the influence of each factor on axial length.

Results: The mean axial length at 40, 52 and 64 weeks were 17.35, 18.80 and 19.78 mm, respectively. The mean axial length with and without ROP at 40 weeks were 17.10 mm and 17.54 mm, respectively, which were statistically significant ($p=0.000$). There was a significant decrease in axial length at 40 weeks in the higher ROP stage ($p<0.05$). Axial length and birth weight showed positive correlation with statistical significance at 40 weeks, while these parameters showed no significant correlation at 64 weeks. Axial length and conceptual age showed a positive correlation with statistical significance at 40 weeks ($p=0.000$), yet a negative correlation at 64 weeks with no statistical significance ($p=0.306$). A significant difference was not observed between sex and the associated diseases.

Conclusions: The factors that affect the axial length of an infants' eye at 40 weeks were ROP and its stage, birth weight, and conceptual age. Additionally, there was no significant relationship between sex and the associated diseases.

J Korean Ophthalmol Soc 2010;51(1):81-87

Key Words: Axial length, Birth weight, Conceptual age, Prematurity, Retinopathy of prematurity

Address reprint requests to Sung Woo Ha, MD

Department of Ophthalmology, CHA University, CHA Bundang Medical Center

#351 Yatap-dong, Bundang-gu, Sungnam 463-712, Korea

Tel: 82-31-780-5330, Fax: 82-31-780-5333, E-mail: swha@chamc.co.kr