40 프리즘디옵터 이상의 외사시에서 수술 전 예측한 수술 후 사시각의 정확성

이병희¹ · 이종욱¹ · 이정호¹ · 오동렬² · 이규원¹ · 권정윤¹

제일안과병원¹, 임&오안과의원²

목적: 40프리즘디옵터(PD) 이상의 외사시 환자에서 수술 전 교정하고자 한 양과 실제 수술 후 교정된 양의 편차를 알아보고자 하였다.
대상과 방법: 두 명의 술자에 의해 두 개의 수평근 수술을 시행하여 6개월이상 경과관찰을 시행한 61명을 대상으로 수술 전 예측한 수술 후 사시각과 수술 후 6주째 잔여사시각의 편차를 측정하여 수술 전 예측한 교정량의 정확성을 알아보았으며, 수술 성공률을 분석하였다.
결과: 40에서 60PD 미만인 외사시에서 예측치의 정확성은 97.8%로 60PD 이상인 경우(62.5%)보다 높았으며, 60PD 이상인 경우에서 교정하고자 한 양보다 많은 양이 교정된 경우가 4안에서 관찰되었다. 수술의 성공률은 수술 후 6개월과 1년에서 각각 40-50PD 미만에서는 96.8%, 94.7%, 50-60PD 미만에서는 71.4%, 60.0%, 60PD 이상인 외사시에서 50.0%, 45.5%이었으며, 두 술자간 성공률 및 예측도의 정확성의 차이는 없었다.

결론: 40에서 60PD미만인 외사시에서는 두 개의 수평근 수술로 60PD이상인 경우보다 수술결과를 정확히 예측할 수 있었고 높은 수술 성공률을 보이므로 효과적인 것으로 생각된다.

〈대한안과학회지 2010;51(12):1614-1619〉

외사시의 수술적 치료방법에는 양안 외직근 후전술과 단안 외직근 후전술 및 내직근 절제술이 주로 시행되고 있으며 그 효과는 대체적으로 차이가 없는 것으로 알려져 있다.^{1,2} 사시각이 40PD 이내의 외사시 경우는 비교적 수술량이 잘 정립되어 있어 성공적인 수술이 가능한 것으로 보고되어 있다. 그러나 40PD 이상의 사시각이 큰 외사시의 경우는 수술자의 경험에 따라 수술량을 가감하여 시행하고 있으며 비교적 수술성공률이 떨어지는 것으로 알려져 있고^{2,3} 수술방법도 아직까지 논란이 되고 있는데, 특히 사시수술을 시행하는 초심자에게는 수술 결과의 예측이 어려울 수 있으며 또한 이런 환자와의 사전 면담에서 큰 부담이 될 수 있다. 현재까지 큰 외사시각을 보이는 경우에 3~4개의 수평근을 동시에 수술하는 것이 좋다는 견해⁴와 2개의 수평근을 최대로 교정한 다음 잔여사시가 있을 경우 2차 수술을 시행하는 것을 권유하는 견해가 있다.^{5,6} 2개의 수평근을 수술하는 방법은 최소한의 외안근을 수술하며 수술 후 잔여

사시각에 대한 이차적인 수술이 수월한 장점이 있다.^{5,6} 그러나 교정효과가 부족한 경우에는 시간이 경과할수록 사시각이 증가하는 경향이 있어서 사시각이 큰 외사시로 나타날 가능성이 있다. 한편 한번에 3-4개의 수평근을 수술하는 방법은 술자에게 부담일 수 있으나 사시각이 큰 경우, 특히 70PD 이상의 외사시의 경우 4개의 수평근 수술이 필요하며 성공률도 높다고 보고되어져 있다.⁴ 따라서 사시각이 큰 외사시에서 예측치가 높은 수술량이 정해질 수 있다면 한번의 수술로도 교정할 수 있으므로 시간적으로나 비용적으로 더욱 효과적일 수 있으며, 특히 초심자에게는 도움이 될 것으로 여겨진다.

이에 본 연구에서는 40PD 이상의 사시각이 큰 외사시에서 서로 다른 두 수술자(Oh and Lee)에 의해 두 개의 수평근을 수술하고 수술 전 교정하고자 한 양과 실제 수술 후 교정된 양의 편차를 측정하여 수술 전 예측한 교정량의 정확성을 알아봄으로써 40PD 이상의 외사시에서 두 개의 수평근 수술의 효과를 알아보고 수술자에 따른 차이가 있는지 알아보려고 하였다.

■ 접 수 일: 2010년 4월 13일 ■ 심사통과일: 2010년 11월 23일

■ 책임저자: 이 정 호

대구시 동구 신암동 803-2

제일안과병원

Tel: 053-959-1751, Fax: 053-959-1758

E-mail: eyejholee@hanmail.net

* 본 논문의 요지는 2008년 대한안과학회 제99회 학술대회에서 구연으로 발표되었음.

대상과 방법

2002년 1월부터 2009년 5월까지 40PD 이상의 외사시로 두 개의 수평근 수술을 시행받고, 6개월이상 경과관찰이 가능했던 61명을 대상으로 후향적 연구를 실시하였다. 대

상환자에는 기본형이나 유사 개산과다형, 감각외사시로 국한하였으며 마비사시, 사시각이 일정하지 않은 사시, A 혹은 V pattern 사시, 듀안안구후퇴증후군과 상사시, 회선사시 혹은 안진이 복합된 경우 등은 연구에서 제외하였다. 과거 병력상 양안 외직근 후전술을 시행하고 난 후 내직근절제술을 시행한 3명은 1차 수술이 본 저자들에 의해 시행된 경우가 아니었으나 본 연구의 목적이 수술 전 교정할 양을 미리 예측하고 실제로 수술 후 교정된 양과의 차이를 보는 것이므로 대상에 포함하여 분석하였다. 대상자의 나이, 성별, 시력, 술 전 원거리 및 근거리 사시각, 사시 수술량, 수술 후 6주, 6개월 및 1년째 사시각, 수술 전 예측한 교정량과 술 후 실제로 교정된 양과의 차이, 마지막 내원시 잔여 사시각, 합병증, 경과관찰 기간을 조사하였다. 사시각 측정 은 제일 안위에서 5미터 거리에서, 근거리 사시각은 33 cm 거리에 물체를 주시한 후 측정되었다. 대부분 교대프리즘가림검사를 이용하여 사시각을 측정하였으며 한눈 시력저하인 환자는 크립스키 프리즘검사법으로 측정하였다. 50PD보다 큰 사시각의 경우는 두 눈에 프리즘을 각각 위치시켜 사시각을 측정하여 프리즘효과를 최소화하였고 이러한 경우에 실제 사시각은 Thompson and Guyton⁷ 보고에 의거하여 구하였다.

사시 수술량은 Kenneth W. Wright⁸가 추천한 수술량을 기준으로 하여 원거리 사시각을 기준으로 수술자에 의해 가감하여 시행하였다(Table 1). 모든 비교 분석은 원거리 사시각을 기준으로 하였고, 외사시 수술 후 외사시쪽으로의 움직임은 첫 6주 이내에 일어나고 그 이후 안정된다는 보고를^{9,10} 바탕으로 수술 전 교정하고자 한 양과 수술 후 6주째 측정된 사시각을 기준으로 하여 실제 교정된 양의 편차를

구하여 ± 10 PD 이내인 경우, 10PD 이상 과교정된 경우, 10PD 이상 저교정된 경우 세가지로 나누어 분석하여 수술 결과예측의 정확성을 분석하였으며, 수술 성공은 술 후 6개월, 1년 째 원거리 사시각이 ± 10 PD이내로 정의하였다.

결 과

대상환자 61명의 평균 나이는 33.2 ± 16.8 세(3~74세)이며 성별분포는 남자는 30명, 여자는 31명이었고, 수술 후 평균 추적관찰기간은 14.3 ± 11.8 개월(6~48개월)이었다. 수술방법은 단안 외직근 후전술 및 내직근 절제술이 53안, 양안 외직근 후전술이 5안, 양안 내직근 절제술이 3안이었다.

대상자의 술 전 사시각은 평균 51.9 ± 13.0 PD였으며 사시수술의 평균 교정량은 48.7 ± 10.0 PD였다(Table 2). 수술 전 사시각을 기준으로 예측된 술 후 사시각과 술 후 6주째 측정된 실제 잔여사시각 사이의 편차가 10PD 이내인 경우는 40PD 이상 50PD 미만에서는 31명 모두가, 50PD 이상 60PD 미만에서는 14명 중 13명이었고, 1명이 예측된 교정량보다 저교정되었다. 그러나, 60PD 이상인 환자에서는 평균차이가 10.2 ± 7.4 PD로 16명 중 10명(62.5%)에서 10PD 이내에 해당되었고 4명이 예측된 교정량보다 많은 교정량을 보였으며, 2명이 예측된 교정량보다 적은 교정량을 보였으나, 전체 대상에서 수술자간 교정량의 예측의 정확성에 유의한 차이는 없었다($p=0.84$) (Table 3, Fig. 1). 예측한 교정량보다 실제로 많은 교정량을 보이는 경우를 각각 살펴보면 Oh의 경우 첫째로 40세 여자로 원거리 사시각은 75PD 외사시였으며 55PD을 교정할 계획으로 외직근 후전술 10 mm, 내직근 절제술 6 mm 시행하였으며 술 후

Table 1. Surgical guidelines

Deviation (PD*)	Bilateral recession of lateral rectus	Unilateral recession of lateral rectus/ resection of medial rectus	Bilateral resection of medial rectus
40PD	8.0~8.5 mm	8.0~8.5 mm/5.0~5.5 mm	5.5 mm
45PD	9.0 mm	8.5~9.0 mm/5.5~6.0 mm	•
50PD	•	9.0 mm/5.5~6.0 mm	6.0 mm
55PD	•	8.5~9.5 mm/6.0 mm	•
> 60PD	•	9.0~10.0 mm/6.0~6.5mm	6.0 mm

*PD=Prism diopters.

Table 2. Demographics of patients with large angle exotropia

	Oh [†]	Lee [†]	Total
Number of patients	37	24	61
Age (year) (range)	29.9 ± 16.3 (3-62)	38.3 ± 3.4 (7-74)	33.2 ± 16.8 (3~74)
Sex (male/female)	17/20	13/11	30/31
Preoperative deviation (PD*, Mean $\pm$ SD)	49.1 ± 10.6 (40-78)	56.2 ± 15.2 (40-94)	51.9 ± 13.0 (40~94)
Corrected deviation (PD*, Mean $\pm$ SD)	46.8 ± 9.5 (30-72)	51.6 ± 10.2 (40-84)	48.7 ± 10.0 (30~84)
Follow-up (months)	17.8 ± 13.5 (6-48)	8.8 ± 5.2 (6-30)	14.3 ± 11.8 (6~48)

*PD = Prism diopters; [†]Oh, Lee = Operator.

Table 3. Discrepancy between preoperatively estimated residual deviation and residual deviation at postoperative 6 weeks in exotropia with over 40PD

Preoperative deviation	Operator	Number of patients	Amount of deviation to correct (PD*)	Discrepancy between estimated residual and postoperative deviations No. (%)		
				within ± 10 PD	Overcorrected [‡]	Undercorrected [§]
40	Oh [†]	13	40	13 (100)	0 (0)	0 (0)
	Lee [†]	4		4 (100)	0 (0)	0 (0)
45	Oh	10	45	10 (100)	0 (0)	0 (0)
	Lee	4		4 (100)	0 (0)	0 (0)
50	Oh	3	50	2 (66.7)	0 (0)	1 (33.3)
	Lee	6		6 (100)	0 (0)	0 (0)
55	Oh	3	50 or 60	3 (100)	0 (0)	0 (0)
	Lee	2		2 (100)	0 (0)	0 (0)
≥ 60	Oh	8	50 or 55 or 60	5 (62.5)	2 (25.0)	1 (12.5)
	Lee	8		5 (62.5)	2 (25.0)	1 (12.5)

*PD = Prism diopters; [†]Oh, Lee = Operator; [‡]Overcorrected = >10 PD overcorrected than estimated residual deviation; [§]Undercorrected = >10 PD undercorrected than estimated residual deviation; No significant difference between two surgeons ($p = 0.84$, Chi-square test).

Table 4. Surgical results according to the deviation angles at postoperative 6weeks, 6months and 1year

Preoperative deviation	Success rate No. (%)		
	Postoperative 6weeks	Postoperative 6months	Postoperative 1year
40 ~ 49PD*	30/31 (96.8)	30/31 (96.8)	18/19 (94.7)
50 ~ 59PD	12/14 (85.7)	10/14 (71.4)	6/10 (60.0)
≥ 60 PD	7/16 (43.8)	8/16 (50.0)	5/11 (45.5)
Total	49/61 (80.3)	48/61 (78.7)	29/40 (72.5)

*PD = Prism diopters.

Figure 1. Scatter diagram of difference between estimated residual deviation and actual residual deviation.

6주째 측정된 원거리 사시각은 5PD 외사시로 실제 교정량은 70PD로 15PD 만큼 더 교정되었다. 둘째로 50세 남자환자로 원거리 사시각은 78PD 외사시였으며 55PD 교정 계획 하에 외직근 후전술 10 mm, 내직근 절제술 6 mm 시행하였으며 술 후 6주째 원거리 사시각은 6PD 외사시로 실제 교정량은 72PD로 17PD 만큼 더 교정되었다. Lee의 경우 첫째로 46세 여자환자로 원거리 사시각은 63PD 외사시였

으며 50PD 교정 계획 하에 외직근 후전술 8.5 mm, 내직근 절제술 6.5 mm 시행하였으며 술 후 6주째 원거리 사시각은 정위였다. 실제 교정량은 63PD로 13PD 만큼 더 교정되었다. 둘째로 74세 남자환자로 원거리 사시각은 94PD 외사시였으며 60PD 교정 계획 하에 외직근 후전술 10 mm, 내직근 절제술 6.5 mm 시행하였으며 술 후 6주째 원거리 사시각은 10PD 외사시로 실제 교정량은 84PD로 24PD 만큼 더 교정되었다.

술 후 6개월과 1년째 원거리 사시각을 기준으로 수술 전 사시각에 따른 수술의 성공률을 보면 40PD 이상 50PD 미만에서는 96.8% (30/31명), 94.7% (18/19명)였고 50PD 이상 60PD 미만에서는 71.4% (10/14명), 60.0% (6/10명)였으며 60PD 이상은 50.0% (8/16명), 45.5% (5/11명)이었으며, 경과관찰기간과 외사시각이 증가할수록, 특히 60PD 이상의 외사시에서 두 개의 수평근 수술만으로는 수술성공률이 낮아지는 경향을 알 수 있었다(Table 4). 수술자간의 수술성공률의 유의한 차이는 없었다($p=0.82$) (Table 5). 그리고 60PD 이상의 외사시에서 수술 후 저교정을 보이는 8명의 환자에서 수술 후 6주째 잔여사시각이 16.8 ± 10.5 PD에서 마지막 경과관찰 시 잔여사시각이 25.0 ± 11.3 PD로 통계학적으로 의미 있는 차이를 보이지 않았다($p=0.074$).

Table 5. Surgical success rates at postoperative last visit according to the preoperative deviations

Preoperative Deviation (PD*)	Operator	Number of patients	Number of patients according to the surgical results (%)		
			Corrected [‡]	Overcorrected [§]	Undercorrected
40 ~ 49	Oh [†]	23	22 (95.7)	0 (0)	1 (4.3)
	Lee [†]	8	8 (100)	0 (0)	0 (0)
50 ~ 59	Oh	6	4 (66.7)	0 (0)	2 (33.3)
	Lee	8	6 (75.0)	0 (0)	2 (25.0)
≥60	Oh	8	3 (37.5)	0 (0)	5 (62.5)
	Lee	8	5 (62.5)	0 (0)	3 (37.5)

*PD = Prism diopters; [†]Oh, Lee = Operator; [‡]Corrected = within 10PD or orthotropia; [§]Overcorrected = >10PD of esotropia; ^{||}Undercorrected = >10PD of exotropia; No significant difference between two surgeons ($p = 0.82$, Chi-square test).

고 찰

40PD 이상의 사시각이 비교적 큰 외사시를 보이는 경우에서 대부분의 환자가 기능적인 측면뿐만 아니라 미용적으로 큰 기대를 갖고 수술을 할 것으로 추측되며 또한 기대하고 있는 것이 사실이다. 그러나 사시수술의 성공률은 실제 사시각이 증가함에 따라 수술의 성공률도 떨어지는 것으로 알려져 있으며 수술결과가 만족스럽지 못한 경우도 종종 경험하는 것이 현실이다. 따라서 수술적 결과를 미리 예측할 수 있다면 수술의 결정에 있어 환자는 물론 의사에게도 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 생각되며 사전 면담시 참고가 될 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구에서는 두명의 수술자에 의해 수술한 대상을 비교하였는데 이는 술자간의 차이를 알아보기 위한 것뿐만 아니라 한명의 초심자와 경험이 많은 술자간의 차이가 있는지 알아보기 위해 비교하였다.

본 연구의 결과를 통하여 미루어 볼 때 40PD 이상 60PD 미만의 외사시의 경우 두 개의 수평균 수술로도 만족한 결과를 얻을 수 있으며, 60PD 이상 특히 70PD 이상의 외사시의 경우에는 두 개의 수평균 수술로는 교정효과가 부족하여 이차 수술이 필요할 것으로 생각된다. 특히, 40PD 이상 60PD 미만의 환자에서는 수술 전 교정하고자 한 양과 수술 후 6주째 측정된 사시각을 기준으로 실제 교정량의 편차를 알아보았을 때 평균 2.4 ± 3.9 PD이었으며, ± 10 PD 이내의 편차 범위 내에 45명 중 44명(97.8%)이 포함되었으나, 60PD 이상인 환자에서는 편차차이가 평균 9.6 ± 6.5 PD이며, ± 10 PD 이내의 편차 범위 내인 경우는 16명 중 10명(62.5%)만으로 수술 전 사시각이 40PD이상 60PD 미만인 환자에 비하여 수술의 정확도가 떨어졌다. 술자별로 60PD 이상의 외사시환자에서 Oh가 8명 중 3명이, Lee도 8명 중 3명이 수술 전 교정하고자 한 양이 실제 교정된 양보다 10PD 이상 차이를 보였으며 비록 대상 환자수가 적었으나 두 수술자 간의 차이는 없었다. 이와 같이 60PD 이상의 외사시에서 수술 전 교정량의 예측치가 부정확한 이유로는

사시각 측정시 50PD 이상인 경우 양안에 프리즘을 사용하여 사시각을 측정하기 때문에 측정치의 정확도가 떨어질 수 있고, 수술 시 후전량이 많기 때문에 caliper로 측정된 후전량이 다소 부정확할 수 있기 때문으로 생각된다. 또한 사시 유병기간이나 발현 빈도에 따라 눈위치 및 안구정렬에 대한 기본적인 눈모임과 눈별림과 같은 눈운동에 대한 기본적인 신경전도자극이 다를 수 있는 것이 원인으로 생각된다.

외사시의 수술의 방법에 따른 차이는 없다고 보고되어 있으나, 사시각이 큰 외사시, 특히 60PD 이상의 큰 외사시를 보이는 경우 술자의 경험에 따라 수술량이 다르며 수술 방법 또한 아직까지 논란이 되고 있다. 과거에는 해부학적인 외안근의 접촉면(arc of contact)에 기초하여 외직근의 외전장애를 생기지 않는 최대 후전량을 7 mm라 하였으나 그 이후 Urist¹¹는 안구의 기능적인 적도부가 안와축에 수직으로 있어 각막윤부로부터 11.0 mm까지 후전하여도 외전장애는 발생하지 않는다고 하였고, 양안 외직근 후전술을 8~9.5 mm 시행하여 외전에 문제가 없음을 보고하였다. 본 연구에서도 후전을 10 mm까지 시행하였으나 외전장애를 나타내는 경우는 없었다.

사시각이 큰 외사시의 경우도 양안 외직근 후전술이나 단안 외직근 후전술 및 내직근 절제술로 최대교정하여 좋은 결과를 보고하고 있으며 Schwartz and Calhoun⁶은 45~85PD의 외사시환자 22명중 14명에서 양안 외직근 후전술, 8명에서 단안의 외직근 후전술 및 내직근 절제술을 시행하였고, 외직근 후전의 범위는 8~14 mm (평균 10.6 mm) 후전하여 15PD를 성공의 기준으로 하여 77%의 수술 성공을 보고하면서 2개의 수평균의 수술을 주장하였다. 국내에는 Park and Min⁵은 40~65PD (평균 45PD)의 외사시 19예에서 양안 8~9.5 mm (평균 8.27 mm) 외직근 후전술을 시행하여 평균 12.2개월의 추적 관찰하여 ± 10 PD를 성공의 기준으로 15예(78.9%)에서 성공적으로 교정되었고 안구운동장애는 없었다고 보고하였다. Lim et al¹²은 40PD 이상의 외사시 환자 168명 중 86명은 양안 외직근 후전술

을 시행하였고 술 전 평균 사시각은 46.4 ± 10.6 PD이고, 82명은 단안 외직근 후전술 및 내직근 절제술을 시행하였고 술 전 평균 사시각은 45.1 ± 8.5 PD이었다. ± 10 PD을 성공의 기준으로 양안 외직근 후전술을 시행한 군은 66.7%, 단안 외직근 후전술 및 내직근 절제술을 시행한 군은 68.1% 성공률을 보여 두 방법간의 수술결과에 있어서 큰 차이가 없다고 하였다. 본 연구에서 대부분의 환자가 단안 외직근 후전술 및 내직근 절제술을 시행하였으며, 술 후 6개월 및 1년째 수술 성공률이 비록 위의 연구와 대상환자수와 관찰기간의 차이를 보이지만 전체 환자를 대상으로 각각 평균 75.7%, 72.5%로 이전 보고와 차이를 나타내지 않았으나, 60PD이상의 외사시인 경우에는 성공률이 50%, 45.5%로 현저히 떨어짐을 알 수 있었다.

사시각의 큰 경우에 있어 한번에 3개 내지 4개의 수평근을 수술하는 것은 한번의 수술로 교정이 가능하여 두번으로 나누어 수술하는 것보다 시간적, 비용적으로 효과적이라고 할 수 있다. Azar⁴는 70PD 이상의 외사시환자 29명에서 양안 외직근 10 mm 후전, 양안 내직근 8 mm 절제하는 4개의 수평근을 수술하여 89.7% (26/29명)에서 4PD 이내로 교정되었다고 보고하면서 70PD 이상의 외사시의 경우 4개의 수평근 수술을 일차적으로 고려할 것을 추천하였다. 국내에서는 Kim et al¹³이 22명의 60PD이상의 환자를 대상으로 일차적으로 양안 외직근 후전술을 최대한 시행하여 관찰한 결과 추가적으로 14명에 대해 단안 또는 양안의 내직근 절제술이 필요하여 60PD이상의 경우에는 양안 외직근 후전술과 단안 또는 양안 내직근 절제술을 함께 시행하는 것이 좋을 것이라는 보고가 있었다. 그러나 3-4개의 수평근 수술 시 정해진 수술량에 대한 지침이 없으며, 2개의 수평근 수술보다 예측도가 떨어질 수 있으며 여러 수평근을 수술하므로 수술 후 과교정이나 안구운동장애가 일어날 수 있고 잔여 사시에 대한 이차수술이 어려울 수 있다. 특히, 본 연구에서와 같이 60PD 이상의 경우에서 수술 전 교정하고자 한 양보다 수술 후 실제 교정량과 비교할 때 10PD 이상의 많은 교정을 보이는 경우가 각 술자마다 2예씩 있었으며 이러한 경우에 실제 잔여사시각은 수술 자체가 저교정되어 외사시가 남아있더라도 실제 교정하고자 한 양보다 많이 교정된 경우이므로 60PD 이상의 경우에서 여러 개 근육을 수술 할 경우에는 반드시 염두해 두어야겠다.

본 연구의 60PD 이상의 외사시에서 두 개의 수평근수술 후 저교정을 보이는 환자에서 수술 후 사시각은 수술 후 6주에 측정한 사시각과 최종 내원시 측정한 값과 통계적으로 의미있는 차이를 보이지 않는 것을 알 수 있었으며 비록 대상환자의 수가 적으나 사시각이 큰 외사시를 보이는 경우에서도 수술 후의 외사시측으로의 움직임은 수술 6주 이

후 비교적 안정되어 남아 있음을 확인할 수 있었다. 그러나, 여러 연구¹⁴⁻¹⁶를 통해 수술 후 시간이 경과할수록 외사시각이 증가하는 것으로 알려져 있으므로 향후 더 많은 환자를 대상으로 장기간 관찰하는 연구가 필요할 것으로 생각된다.

수술의 합병증으로 많은 양의 후전술이나 절제술시 안구운동장애가 발생할 수 있으나 본 연구에서는 오래 지속된 외사시로 인한 이측 구결막의 단축으로 수술 후 초기에 일시적으로 내전 제한을 보이는 경우도 있었으나 경과관찰기간 동안 자연히 좋아졌으며, 내직근 절제술과 외직근 후전술 시행한 경우에 첫 한달에서 외전 장애를 보이는 경우가 있었으나 경과 관찰시 모두 없어져 안구운동장애가 남은 경우는 없었다.

결론적으로 사시각이 40PD 이상 60PD 미만인 외사시에서는 두 개의 수평근 수술만으로도 수술 전 교정하고자 한 양과 실제로 교정된 양의 비교에서 일치치를 보이는 경우가 높았으며 교정효과가 만족스러웠다. 한편 60PD 이상의 외사시의 경우에는 두 개의 수평근 수술만으로는 성공률이 떨어지며, 수술 전 교정하고자 한 양과 실제 교정된 양과의 비교에서도 정확도가 다소 떨어져 수술의 결과에 대한 예측이 부정확할 것으로 생각되며, 특히 60PD 이상의 외사시에서 3개근 이상의 수술 시에는 본 연구에서와 같이 두 개의 수평근 수술 후 저교정을 보여 외사시가 남아있더라도 실제로 교정되는 양이 예측한 양보다 많은 교정을 나타낼 수 있는 예도 있으므로 주의해야 할 것으로 사료된다.

참고문헌

- 1) Lew HL, Lee JB, Kim TK. Comparison of surgical results between bilateral rectus muscle recessions and lateral rectus muscle recession and medial rectus muscle resection in exotropia. J Korean Ophthalmol Soc 1995;36:115-9.
- 2) Im SK, Park SW, Park YG. Effects of bilateral lateral rectus recession and unilateral recession-resection in large angle exotropia. J Korean Ophthalmol Soc 2004;45:990-4.
- 3) Livir-Rallatos G, Gunton KB, Calhoun JH. Surgical results in large-angle exotropia. J AAPOS 2002;6:77-80.
- 4) Azar RF. Surgical management of exotropia exceeding 70 prism diopters. Ann Ophthalmol 1971;3:159-66.
- 5) Park YG, Min BM. The effects of bilateral recti recessions over 8mm in exotropia over 40 prism diopters. J Korean Ophthalmol Soc 1994;35:1123-6.
- 6) Schwartz RL, Calhoun JH. Surgery of large angle exotropia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1980;17:359-63.
- 7) Thompson JT, Guyton DL. Ophthalmic prisms. Measurement errors and how to minimize them. Ophthalmology 1983;90:204-10.
- 8) Wright KW. Color atlas of ophthalmic surgery Strabismus 1st ed. Philadelphia: Lippincott company, 1991;241-3.
- 9) Scott WE, Keech R, March AJ. The postoperative results and sta-

- bility of exodeviations. Arch Ophthalmol 1981;99:1814-8.
- 10) Park YH, Kim MM. Surgical results of intermittent exotropia. J Korean Ophthalmol Soc 1989;30:969-74.
- 11) Urist MJ. Exotropia with bilateral elevation in adduction. II. Surgery. Am J Ophthalmol 1954;38:178-90.
- 12) Lim HS, Seo SW, Lee JH. Comparison of surgical results between bilateral rectus muscle recession and lateral rectus muscle recession and medial rectus muscle resection in exotropia over 40 prism diopters. J Korean Ophthalmol Soc 1998;39:2810-5.
- 13) Kim JW, Rah SH, Lee JH. The surgical treatment of exotropias of 60 prism diopters or more. J Korean Ophthalmol Soc 1997;38:2200-6.
- 14) Kim SJ, Lee WS. Clinical analysis of surgical results in exodeviation. J Korean Ophthalmol Soc 1992;33:724-32.
- 15) Kim MM, Cho ST. Long - term surgical results of intermittent exotropia. J Korean Ophthalmol Soc 1994;35:1321-6.
- 16) Hahm KH, Shin MC, Sohn MA. The change in deviation angle with time course after surgical correction of intermittent exotropia. J Korean Ophthalmol Soc 2002;43:2214-9.

=ABSTRACT=

The Accuracy of Estimating Postoperative Deviation in Exotropia With over 40 Prism Diopters

Byeong Hee Lee, MD¹, Jong Wook Lee, MD¹, Jung Ho Lee, MD¹,
Dong Ryeul Oh, MD², Kyoo Won Lee, MD¹, Jung Yoon Kwon, MD¹

Cheil Eye Hospital¹, Daegu, Korea
Lim&Oh Eye Clinic², Daegu, Korea

Purpose: To assess the accuracy of estimating postoperative deviation in large-angle exotropia over 40 prism diopters (PD).

Methods: A retrospective analysis was performed on 61 exotropia patients with over 40 PD exotropia who had undergone 2-muscle surgery by two surgeons and with at least 6 months follow-up. The accuracy was assessed by analyzing the discrepancy between preoperatively predicted residual deviation and deviation at postoperative 6weeks. Successful surgery was defined as deviation within ± 10 PD at the last postoperative visit.

Results: More accurate residual deviation was predicted in exotropia with prism diopters between 40 and 59 (97.8%) than in exotropia with 60 PD or more (62.5%). And there was no significant difference between two surgeons. Surgical success rates at six months and one year after surgery were 96.8%, 94.7% in exotropia with 40 to 49 PD, 71.4%, 60.0%, 50 to 59 PD, 50.0%, 45.5%, 60 PD or more, respectively. There were four patients of whom the postoperative deviation angle exceeded more than 10 PD of the estimated deviation.

Conclusions: The accuracy of estimating residual deviation prior to surgery was higher and more successful surgery was achieved in exotropia ranging in 40 to 59 PD than in exotropia with 60 PD or more. Therefore, 2- muscle surgery will be suitable for large-angle exotropia with less than 60 PD.

J Korean Ophthalmol Soc 2010;51(12):1614-1619

Key Words: Large-angle exotropia

Address reprint requests to **Jung Ho Lee, MD**
Cheil Eye Hospital
#803-2 Sinam-dong, Dong-gu, Daegu 701-011, Korea
Tel: 82-53-959-1751, Fax: 82-53-959-1758, E-mail: eyejholee@hanmail.net